


Helpwch i amddiffyn eich plentyn rhag y fflw y gaeaf hwn



Y gaeaf hwn mae paediatregwyr yn gweld cyfraddau uchel o achosion o fflw mewn plant a phobl ifanc. Mae'n bwysig cofio nad annwyd drwg yn unig yw fflw, gall wneud i blant deimlo'n wael iawn ac arwain at gymhlethdodau difrifol.

Bob gaeaf yn y DU, mae miloedd o blant, hyd yn oed y rhai heb gyflyrau iechyd sylfaenol, angen gofal ysbyty oherwydd y fflw.

Mae symptomau cyffredin yn cynnwys:

- Tymheredd uchel
- Cyhyrau a chymalau poenus
- Blinder ofnadwy
- Symptomau tebyg i annwyd fel peswch a dolur gwddf
- Mewn rhai achosion, gall fflw arwain at broblemau mwy difrifol fel niwmonia neu orfod mynd i'r ysbyty.

Beth allwch chi ei wneud?

Y ffordd orau o helpu i amddiffyn eich plentyn yw eu brechu rhag y fflw. Mae'r brechlyn fflw yn ddiogel, yn effeithiol, ac yn cael ei gynnis am ddim gan y GIG. Nid yn unig mae'n helpu i amddiffyn eich plentyn rhag mynd yn ddifrifol sâl ond mae hefyd yn helpu i leihau'r tebygolrwydd o ledaenu'r salwch i eraill a allai fod yn fwy agored i niwed, fel neiniau a theidiau, babanod, a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.

Pwy all gael y brechlyn fflw?

Mae GIG Cymru yn cynnis brechlyn fflw i blant am ddim bob hydref neu ddechrau'r gaeaf i:

- Bob plentyn 2 a 3 oed ar 31 Awst 2025
- Plant oedran ysgol o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11
- Plant rhwng 6 mis a 17 oed sydd â chyflyrau iechyd hirdymor penodol

Gall y rhan fwyaf o blant sy'n gymwys i gael brechlyn fflw gael chwistrell yn y trwyn, sy'n gyflym, yn ddi-boen ac yn effeithiol. Fodd bynnag, efallai y bydd plant a phobl ifanc yn y grwpiau canlynol yn cael cynnis pigiad y brechlyn fflw yn lle hynny:

- Eu bod o dan 2 oed
- Bod ganddynt gyflyrau meddygol penodol, eu bod ar driniaeth benodol, yn feichiog neu fod ganddynt alergeddau i'r brechlyn neu'r cynhwysion
- Bod ganddynt system imiwneidd wan neu'n byw gyda rhywun sydd â system imiwneidd wan
- Bod ganddynt frest sy'n wichlyd ar y diwrnod neu yn y tri diwrnod blaenorol neu fod ganddynt symptomau asthma diweddar
- Nid ydynt yn derbyn y defnydd o gelatin moch mewn cynhyrchion meddygol

Os nad ydych yn siŵr pa frechlyn sy'n addas ar gyfer eich plentyn, siaradwch â'ch meddyg teulu neu nyrs ysgol.

Sut bydd eich plentyn yn cael cynnis y brechlyn?

- Mae manylion am drefniadau lleol ar gael ar wefannau'r byrddau iechyd. Yn gyffredinol: Gall plant rhwng 2 a 3 oed gael eu brechlyn gan eu meddyg teulu ac mewn rhai ardaloedd gall plant 3 oed gael eu brechlyn mewn meithrinfa.
- Bydd plant a phobl ifanc sy'n mynychu'r ysgol fel arfer yn cael eu brechlyn fflw yn yr ysgol gan nyrsys ysgol. Bydd rhieni yn cael gwybodaeth am y brechlyn, ynghyd â ffurflen ganiatâd bapur neu ddigidol.
- Gall plant a phobl ifanc pedair oed neu hŷn nad ydynt mewn addysg brif ffrwd gael eu brechlyn fflw yn eu meddygfa neu glinig brechu cymunedol.
- Os yw'ch plentyn o dan ddwy oed, neu'n 16 neu 17 oed, ac mewn mwy o berygl o gymhlethdodau o'r fflw oherwydd cyflwr iechyd, dylai eu meddygfa eu gwahodd i gael eu brechlyn.

Wedi colli'r apwyntiad?

Os yw'ch plentyn yn colli eu brechlyn fflw, siaradwch a'u hymwelydd iechyd (os yw'ch plentyn o dan 5 oed), nyrs ysgol neu feddygfa'r meddyg i gael gwybod am drefniadau lleol ar gyfer cael eu brechlyn ar adeg arall.



**Coleg Brenhinol
Pediatrieg ac Iechyd Plant
Cymru**

Yn arwain y ffordd ar Iechyd Plant

**Pa
mor effeithiol
yw'r brechlyn wrth
atal y fflw?**

Er bod effeithiolrwydd y brechlyn fflw yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, yn dibynnu os yw'r brechlyn yn cyd-fynd â'r straen fflw sy'n cylchredeg, bydd bob amser yn cynnig math o amddiffyniad.

Mae hefyd yn lleihau'n sylweddol pa mor ddifrifol fydd y fflw os byddwch chi'n mynd yn sâl, gan leihau'r risg o fynd i'r ysbyty, derbyn gofal dwys a hyd yn oed marwolaeth mewn grwpiau. risg uchel fel yr henoed a phlant ifanc.

**Ydi'r
brechlyn yn
achosi'r fflw?**

Nac ydi. Mae'r firysau fflw yn y brechlyn i'w chwistrellu wedi'u hanactifadu ac ni allant achosi fflw. Mae'r brechlyn chwistrelliad trwyn yn cynnwys firysau byw sydd wedi'u gwanhau ac ni allant achosi fflw.

**Os
cafodd fy
mhleintyn ei frechu
y llynedd, oes angen i mi
wneud hynny eto?**

Oes. Mae angen i'ch pleintyn gael ei frechu eto eleni, hyd yn oed os cawsant eu brechu y llynedd. Mae firysau fflw yn newid bob blwyddyn, felly mae brechlyn newydd yn cael ei greu bob blwyddyn i amddiffyn rhag y straen mwyaf tebygol sy'n cylchredeg.

**Oes
yan sgîl-
effeithiau i'r brechlyn?**

Gall sgîl-effeithiau brechlyn chwistrelliad trwyn gynnwys symptomau tebyg i annwyd, cur pen a theimlo'n flinedig ond nid fflw yw hyn. Gall brechlyn i'w chwistrellu hefyd achosi sgîl-effeithiau tymheredd uchel neu gorff poenus, ond nid fflw yw hyn. Mae sgîl-effeithiau'r brechlyn yn llawer ysgafnach na chael y fflw.

Angen mwy o wybodaeth?

icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/brechladaur-gaeaf/



**Helpwch i
amddiffyn eich
plentyn rhag y
fflw y gaeaf hwn**

